

## Nachweise der Alpenfledermaus (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837), der Weißrandfledermaus (*Pipistrellus kuhlii* KUHL, 1817) und der Langflügelfledermaus (*Miniopterus schreibersii* KUHL, 1817) aus Schleswig-Holstein (Norddeutschland)

Von HOLGER SIEMERS<sup>1</sup>, DOROTHEA BARRE<sup>2</sup> & KARL KUGELSCHAFTER<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Am Köppenberg 24, D-23899 Gudow, E-Mail: hs.bat@t-online.de

<sup>2</sup> Schneiderkoppel 21, D-24109 Melsdorf, E-Mail: info@barre-ultraschall.de

<sup>3</sup> Hollersgraben 27, D-35102 Lohra, E-Mail: kugelschafter@web.de

**Records of Savi's pipistrelle (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837),  
Kuhl's pipistrelle (*Pipistrellus kuhlii* KUHL, 1817) and Schreiber's bent-winged bat  
(*Miniopterus schreibersii* KUHL, 1817) from Schleswig-Holstein (Northern Germany)**

### Abstract

In Schleswig-Holstein, Germany's northernmost state, several rare species of bats have recently been detected. In long-term bioacoustic surveys in Gudow, search calls of a Savi's pipistrelle have been recorded successfully and in Bad Segeberg, the presence of a Kuhl's Pipistrelle bat could be confirmed by means of social calls. The record of another Savi's pipistrelle was achieved by a photo of attentive homeowners in Mölln. Moreover, the multiple entry of

a Schreiber's Bent-winged Bat into an above-ground hibernaculum in Kiel could be documented by means of a photo monitoring system.

### Keywords

Savi's Pipistrelle, Kuhl's Pipistrelle, Schreiber's Bent-winged Bat, Records, Northern Germany, Schleswig-Holstein

### Zusammenfassung

In Schleswig-Holstein, dem nördlichsten Bundesland Deutschlands, konnten in letzter Zeit mehrere, seltene Fledermausarten nachgewiesen werden. Bei bioakustischen Dauererfassungen in Gudow gelang die Aufnahme von Ortungsrufen einer Alpenfledermaus und in Bad Segeberg konnte anhand von Sozialrufen der Durchflug einer Weißrandfledermaus belegt werden. Der Nachweis einer weiteren Alpenfledermaus gelang durch ein Foto aufmerksamer Hausbesitzer in Mölln. Des Weiteren konnte der mehrfache

Einflug einer Langflügelfledermaus in ein oberirdisches Winterquartier in Kiel mittels einer Fotomonitoringanlage dokumentiert werden.

### Schlüsselwörter

Alpenfledermaus, Weißrandfledermaus, Langflügelfledermaus, Nachweise, Norddeutschland, Schleswig-Holstein

- artspezifischen Dispersionsdynamik. *Nyctalus* (N.F.) **15** (2-3), 171-179.
- BARATAUD, M. (2015): Acoustic Ecology of European Bats. Species Identification, Study of their Habitats and Foraging Behaviour. Biotope Éditions, National Museum of Natural History, Paris, 348 pp.
- BfN (2019): Nationaler Bericht 2019 gemäß FFH-Richtlinie. [<https://www.bfn.de/themen/natura-2000/berichtemonitoring/nationaler-ffh-bericht.html> (Aufruf 17.11.2019)], Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
- DIETZ, C., & KIEFER, A. (2014): Die Fledermäuse Europas. Kennen, Bestimmen, Schützen. Kosmos Verlag, Stuttgart, 400 pp.
- KATZENSTEIN, H. (2000): Nachweis der Alpenfledermaus (*Hypsugo savii*) in Ostholstein. *Nyctalus* (N.F.) **7** (4), 453-454.
- KUGELSCHAFTER K., HORVATH T., FINKERNAGEL F., SPRUCK B. & VOLK T. (2014): Non-Invasive monitoring of hibernacula using light barrier systems in combination with photo technique. Posterpräsentation auf dem 13th European Bat Research Symposium (EBRS) in Sibenik, Kroatien, Abstract: 106.
- LIEGL, C. & SEIDLER, F. (2005): Erstnachweis einer Wochentube der Weißrandfledermaus, *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817), in Deutschland mit phänologischen Angaben. *Nyctalus* (N.F.) **10** (1), 5-8.
- MIDDLETON, N., FROUD, A. & FRENCH, K. (2014): Social Calls of the Bats of Britain and Ireland. Pelagic Publishing, Exeter, 176 pp.
- OHLENDORF, B., VIERHAUS, H., HEDDERGOTT, M. & BODINO, F. (2000): Korrektur: Fund einer Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii*) in Hamburg (ds. Z. Bd. 5, p. 220) betraf eine Alpenfledermaus (*Hypsugo savii*). *Nyctalus* (N.F.), **7** (4), 454.
- PFALZER, G. (2002): Inter- und intraspezifische Variabilität der Soziallaute heimischer Fledermausarten (Chiroptera: Vespertilionidae). Mensch und Buch Verlag, Berlin, 251 pp.
- REITER, G., WEGLEITNER, S., HÜTTMEIR, U. & POLLHEIMER, M. (2010): Die Alpenfledermaus, *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837), in Mitteleuropa. *Nyctalus* (N.F.) **15** (2-3), 158-170.
- SCHUBERT, B., ROSSNER, M. & BÖHME, J. (2019): Erstnachweis der Weißrandfledermaus (*Pipistrellus kuhlii*, KUHL 1817) und Hinweise zum Vorkommen der Alpenfledermaus (*Hypsugo savii*, BONAPARTE 1837) in Sachsen. *Nyctalus* (N.F.), **19** (3), 212-225.
- SKIBA, R. (2009): Europäische Fledermäuse. Kennzeichen, Echoortung und Detektoranwendung. 2. Aufl. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 648, Hohenwarsleben, 220 pp.
- WOITON, A., KÜHN, N., HELBIG-BONITZ, M., HELD, H., HENRICH-MANN, C., KERTH, C., KUNTH, J., LUDWIG, M. & OHLENDORF, B. (2019): Erstnachweis der Alpenfledermaus (*Hypsugo savii*, BONAPARTE 1837) mit Reproduktionsstatus in Leipzig. *Nyctalus* (N.F.), **19** (3), 226-241.
- ZAHN, A. (2019): Fledermausschutz in Südbayern 2014-2018. Untersuchungen zur Bestandsermittlung und zum Schutz von Fledermäusen in Südbayern im Zeitraum 01.05.2014 bis 31.03.2018. UmweltSpezial. Herausgegeben vom Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Augsburg, 79 pp.

## Literatur

ADORF, F., & STARRACH, M. (2010): Neue bioakustische Nachweise der Alpenfledermaus, *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837), und des Riesenabendseglers, *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780), aus der Bundesrepublik – eine kritische Betrachtung mit Anmerkungen zur